

OFICIO No CE/2013/07

**ASUNTO: RECOMENDACIONES ACCIONES
PREVENTIVAS CÓLERA**

**C. CELESTINO JUAN LÓPEZCHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, OAXACA.**

PRESENTE

Dada la presencia de casos de cólera en el territorio nacional, es deber del *Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla Oaxaca y Tlaxcala* (PADHPOT) efectuar la recomendación al municipio a su digno cargo de iniciar una campaña preventiva con el fin de mantener al municipio de San Francisco Telixtlahuaca libre de la presencia de dicha enfermedad.

Recomendamos seguir el protocolo de saneamiento y promoción de la salud, contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994 que incluye entre otras medidas:

- Preservar la calidad del agua en cualquier parte del sistema hasta en los puntos más alejados de la red de distribución, mediante la desinfección continua y permanente del agua que garantice la existencia de cloro residual libre entre 0.5 a 1.0 mg/l. Cuando se presenten interrupciones prolongadas del servicio, debidas a fallas mecánicas, eléctricas, por mantenimiento o de cualquier otra causa, al restablecimiento del servicio se debe reforzar la desinfección durante las seis horas siguientes, garantizando la existencia de cloro residual libre entre 1.0 a 1.5 mg/l .

Se recomienda desinfectar agregando una pastilla de hipoclorito de calcio al 65% de 7.5 gramos por cada 10 metros cúbicos de agua con el fin de llegar a una concentración de 0.5 mg/l de cloro residual o la mitad de una pastilla por cada metro cúbico para lograr una concentración de 2.5 mg/l en el tanque y asegurar concentraciones de 0.5 mg/l de cloro residual en los puntos más alejados de la red. El agua se deja reposar durante 30 minutos antes de utilizarla.

- Estimular la adopción de estilos saludables entre la población, como:
- Desinfección del agua hirviéndola durante 5 minutos a partir del momento en que comienza a burbujear o agregando dos gotas de cloro por cada litro de agua, mezclando perfectamente y dejando reposar por 30 minutos.
 - La cocción de alimentos
 - El lavado y tallado con estropajo de frutas, legumbres y verdura. Aquellas que no se puedan tallar, sumergirlas 30 minutos en agua con cloro (dos gotas por cada litro de agua)
 - El lavado de manos con agua y jabón antes de comer y de preparar alimentos y después de ir al baño o de cambiar pañales.



- Proteger y mantener limpias las fuentes de abastecimiento.

También es necesario informar a la población a dónde debe acudir para recibir atención médica en caso de presentar vómito o diarrea.

Agradezco de antemano su apoyo y atención a la recomendación y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, D.F., a 21 de octubre de 2013

**DR. RAFAEL VAL SEGURA
COORDINADOR EJECUTIVO
PADHPOT
UNAM**

Ccp. C. Juan Cruz Juárez. Regidor de Salud de San Francisco Telixtlahuaca. Presente